

CIRUGIA DE PANCREAS

TUMORES CON POTENCIAL MALIGNO

De reciente reconocimiento, y sobre todo a partir del desarrollo de radiología sofisticada, como son la TAC y la RM, se han descrito unas lesiones quísticas muy características en el páncreas, lesiones quísticas que están en relación con el órgano como tal, pero sobre todo con el conducto pancreático (Wirsung).

Estas lesiones se conocen con el nombre de Tumor Mucinoso Papilar Intraductal (TMPI), estas lesiones son sobre todo quísticas, aunque pueden tener un componente tumoral más o menos importante. Estas lesiones se relacionan o bien con el conducto principal, o bien con los conductos secundarios. En la actualidad está en discusión cuando es la conveniencia de quitarlos, puesto que implica una intervención muy agresiva. Se sabe que aquellos que dependen del conducto principal (Wirsung) tienen mayor potencial y éste se relaciona con: el crecimiento, la presencia de nódulos en la pared del quiste o el tamaño si supera el centímetro. En cualquier caso, es importante la práctica de una biopsia mediante la utilización de aguja fina (PAF) y con control ecográfico endoscópico, para confirmar la naturaleza del tumor y con ello la necesidad de la intervención.

1. ¿Se tienen que operar siempre?

No siempre tienen indicación quirúrgica. Hay unas características que pueden aconsejar la intervención quirúrgica, como son las antes señaladas de; el tamaño (si supera 1 cm), el crecimiento, o la presencia de nódulos en la pared del quiste. La confirmación de la naturaleza del tumor ante esas características haría necesaria la intervención quirúrgica. Si no es así, la observación y la evolución a lo largo del tiempo, marcará la necesidad de hacerlo

2. ¿Es un tumor benigno o un cáncer?

Son lesiones que inicialmente son benignas, sin embargo, en la evolución y crecimiento desarrollan un tumor maligno en su interior que tiene las características de un Carcinoma y por lo tanto se comporta con una gran agresividad. Es por ello que, ante la sospecha, debe ser tratado quirúrgicamente.

3. ¿En qué consiste la operación?

Una vez establecida la intervención y teniendo entonces la sospecha de que podría estar ya malignizado, la intervención a realizar debe de ser con criterios oncológicos. Esto quiere decir que hay que extirpar el tumor y parte del tejido sano de alrededor.



Instituto
Quirúrgico

El páncreas se encuentra en una encrucijada anatómica muy compleja, por donde pasan arterias y venas que irrigan el tubo digestivo y al mismo tiempo recogen la sangre y la llevan al hígado. Por lo tanto, es una cirugía compleja que requiere de una buena formación quirúrgica.